

Avertissements agricoles



Bulletin n° 23 du 03 septembre 1986

Numérotation continue : n° 23

- . COLZA : mettez en place les cuvettes jaunes
- . A CONSERVER : fiche ravageurs du colza
- . CEREALES : réfléchissez avant de semer

COLZA :

- Mise en place des cuvettes jaunes :

Avant la levée du colza, placez une cuvette jaune dans votre parcelle. Elle vous permettra :

- . de repérer avec précision l'arrivée des insectes dans la parcelle
- . de positionner votre intervention (si elle s'avère nécessaire) avec le maximum de chance de réussite
- . de gagner du temps, il est en effet plus facile de vérifier une cuvette que d'examiner plusieurs plantes.

ATTENTION : Si la cuvette vous permet de repérer l'arrivée des premiers insectes dans la parcelle, il est ensuite nécessaire de vérifier les plantes pour estimer l'importance de la population.

La cuvette doit être déposée en respectant quelques règles élémentaires précisées sur la fiche ci-jointe (page 3).

Premier insecte à surveiller : la GROSSE ALTISE

- . déjà signalée dans le Pays-Haut
- . période de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles vraies
- . seuils d'intervention :
 - * 20 à 30 captures cumulées après le stade B2
 - * ou 3 pieds sur 10 présentant des morsures nutritionnelles (à ne pas confondre avec les dégâts de limaces).
- . produits utilisables : voir fiche page 4.

Imprimerie de la Station de Strasbourg

Directeur-Gérant D. VERBEKE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Publication Périodique :

CPPAP N° 1848 AD 2011 AD

Abonnement annuel 110 F 150 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Cité Administrative
54043 NANCY CEDEX

Tél : (8) 337.26.45.



737

CEREALES :

- Quelques précautions à prendre avant de semer :

Les semis d'orge d'hiver vont intervenir dans quelques semaines, plusieurs mesures simples prises avant la mise en place peuvent vous éviter quelques soucis :

1 - Ne semez pas trop tôt :

Des semis trop précoces vous exposent davantage aux attaques de pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante. L'expérience démontre qu'en Lorraine les plus grosses attaques s'observent le plus souvent sur des semis antérieurs au 20 septembre, aussi, nous vous conseillons d'attendre le 15 septembre pour débiter vos semailles.

IMPORTANT : Les blés sont aussi sensibles à la J.N.O. que les orges.

2 - Pensez à la mosaïque : voir notre bulletin n° 21 du 11 août.

3 - Prévoyez les traces de roues :


Elles vous serviront pour les desherbages, les épandages d'engrais et les traitements fongicides ou insecticides ultérieurs.

Avantages :

- . limitation des surfaces tassées
- . précision des traitements (absence de manque ou redoublement)
- . gain de temps (suppression des jalonnages)
- . pertes limitées, les rangs bordans les traces compensent en grande partie les épis manquants.

Ne tracez que les passages nécessaires, souvenez-vous que si la largeur de votre pulvérisateur est un multiple impair (3, 5, 7) de la largeur de votre semoir, vous semez votre premier rang normalement. Par contre, s'il est un multiple pair (4, 6, 8), le premier passage, contre la bordure du champ, sera semé sur la moitié de la largeur du semoir.

Largeur du semoir	3 m						4 m			
Largeur du pulvérisateur	9 m	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	12 m	16 m	20 m	24 m
Nombre de passages de semoir sans traces de roues entre 2 passages avec traces	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5
Nombre de passages de semoir à partir de la bordure du champ avant le 1er passage avec traces de roues	1	1,5	2	2,5	3	3,5	1	1,5	2	2,5



Bordure
de champ

Ex. 1 : Semoir = 3 m
Pulvérisateur = 15 m

Ex. 2 : Semoir = 4 m
Pulvérisateur : 24 m

